

ORIENTAÇÕES GERAIS

- Administre o medicamento com água;
- Respeite os horários para administrá-los;
- Se esquecer algum horário, dê assim que lembrar. Se estiver muito próximo da hora de tomar o outro, esqueça esse e dê somente a dose do próximo horário;
- Não guarde os medicamentos na cozinha ou banheiro. Proteja-os da luz, calor;
- Verifique a validade do medicamento;
- Se a criança apresentar sinais ou sintomas como náuseas e/ou vômitos, gosto ruim na boca, diarreia, excesso ou perda de sono, alterações de humor, alterações visuais, alterações na pele, tais como: vermelhidão, placas, bolhas ou coceira, avise imediatamente seu médico para que ele avalie e decida se deve ou não suspender o tratamento.



AUTOMEDICAÇÃO É UM RISCO!

Evite o uso de medicamentos por conta própria, sem orientação ou prescrição de um profissional de saúde habilitado.

ATENÇÃO!

Mantenha os medicamentos fora do alcance de crianças. Após usá-los, guarde-os imediatamente.

Em caso de intoxicação ou superdosagem, procure o médico ou farmacêutico. Ligue para o SAMU 192 ou para o CIAV

 /HospitalSantaIzabel

www.santacasaba.org.br/hospital

Marcação de exames e consultas: 71 2203-8100

Telefone Geral: 71 2203-8444

Praça Conselheiro Almeida Couto, 500, Nazaré, Salvador - BA

Responsável técnico assistencial: Dr. Ricardo Madureira. CREMEB 12793

Hospital
SANTA IZABEL



ORIENTAÇÕES FARMACÊUTICAS



Hospital
SANTA IZABEL



ASSISTÊNCIA DOMICILIAR
ALTA HOSPITALAR

PREPARO E DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS



- Só triture comprimidos caso não haja xarope e formulações orais;
- Lave as mãos e higienize os recipientes;
- Procure usar recipientes exclusivos para o preparo de medicamentos;
- Utilize sempre água potável;
- Respeite a proporção de água indicada pelo médico para diluir o medicamento, o volume fará diferença na dose que a criança receberá;
- Uma colher de sopa ou de chá podem ser diferentes dependendo do faqueiro, por isso a seringa é a melhor forma de medir a dosagem certa dos medicamentos para crianças.



- Para evitar interação medicamentosa, os medicamentos devem ser administrados separadamente. Se não for possível, lave o catéter com 5mL de água antes da próxima administração.

Aguarde ao menos 30 minutos após infusão da dieta para administrar medicamentos. Lave com 5 a 10mL de água, antes e após, para evitar possíveis interações alimentares que possam obstruir o catéter. Em caso de obstrução, lave com água. Não use fios guia!


▶ Mantenha a região da pele em volta do catéter gástrico sempre limpa, seca e íntegra. A qualquer sinal de pus, vazamento gástrico vermelhidão ou inchaço, deve-se dirigir-se à unidade de saúde.

Mantenha o estímulo a higiene bucal ao menos 3 vezes ao dia para evitar gengivites e outras complicações



TRAQUEOSTOMIA

- Para evitar infecções, mantenha a cânula limpa e sem secreções;
- A frequência da aspiração depende da quantidade da secreção, faça ao menos antes de dormir e acordar e o tempo não deve ser prolongado;
- A profundidade da aspiração não deve ultrapassar o comprimento da cânula, para evitar traumas na traqueia;
- Higienize o estoma ao menos uma vez ao dia. Só use pomadas se expressa indicação médica.



ATENÇÃO PARA TRAQUEÍTE

Aumento ou alteração da secreção + com ou sem febre + queda do estado geral.