

 <p><b>ALÉRGICOS</b></p>	<p><i>Placas vermelhas no corpo, urticária; coceira, inchaço da boca, face, língua ou garganta, surgimento de bolhas ou descamação, associadas ou não a febre, chiado, aperto no peito ou na garganta, dificuldade para respirar, engolir ou falar, rouquidão incomum.</i></p>
 <p><b>SANGRAMENTO</b></p>	<p><i>Vomitir sangue ou líquido com aspecto de grãos de café, tossir sangue, sangue na urina, fezes pretas ou avermelhadas, sangramento gengival ou sangramento vaginal (além do normal), hematomas sem razão ou que aumentam ou sangramento que não cessa.</i></p>
 <p><b>RENAIS</b></p>	<p><i>Incapacidade de urinar, mudança na quantidade de urina, sangue na urina, grande ganho de peso.</i></p>
 <p><b>HEPÁTICOS (Fígado)</b></p>	<p><i>Urina escura, cansaço além do normal, falta de fome, fezes de cor clara, vômito, pele ou olhar amarelados, tontura ou desmaio, confusão, dor de cabeça intensa, zumbido nos ouvidos, perda de audição, dor de barriga intensa, agitação ou convulsão.</i></p>

ESTE GUIA SERVE COMO INFORMATIVO PARA OS CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. PORÉM NADA SUBSTITUI O COMPROMISSO ESTABELECIDO ENTRE OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTE PARA ALCANÇAR O SUCESSO DO TRATAMENTO.

EM CASO DE DÚVIDA, NOSSA EQUIPE ESTARÁ À DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS. SERVIÇO DE FARMÁCIA CLÍNICA DO HOSPITAL SANTA IZABEL: (71) 2203-8918 OU 2203-8903

**USE SEUS MEDICAMENTOS COM SEGURANÇA!**

SERVIÇO DE FARMÁCIA CLÍNICA  
HOSPITAL SANTA IZABEL



[f/HospitalSantalzabel](https://www.facebook.com/HospitalSantalzabel)  
www.santacasaba.org.br/hospital  
Marcação de exames e consultas: 71 2203-8100  
Telefone Geral: 71 2203-8444  
Praça Conselheiro Almeida Couto, 500, Nazaré, Salvador - BA

rocha

# ORIENTAÇÕES FARMACÊUTICAS



**USO DE DUPLA ANTIAGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA EM PACIENTES PÓS-ANGIOPLASTIA**

Diretor Técnico: Dr. Ricardo Madureira - CREMEB 12793 - COD. 10678

## O que é Dupla Antiagregação Plaquetária?

Combinação de dois medicamentos que agem inibindo a agregação plaquetária, responsável pela formação dos trombos que ocasionam o infarto ou Acidente Vascular Cerebral isquêmico (AVCi).

**Exemplo:**

Ácido Acetilsalicílico/Aspirina (AAS)

+

Clopidogrel (Plavix) ou

AAS

+

Ticagrelor (Brilinta)

## Qual a finalidade desse tratamento?

- Prevenção de novo AVCi ou infarto do miocárdio (coração)
- Prevenção de trombos no stent implantado
- Redução dos riscos de infarto, AVCi e morte súbita

## O que é preciso dizer ao seu médico ANTES de iniciar a terapia?

- Informe se possui alergia a algum dos medicamentos prescritos

SE SIM: RELATAR QUAIS SINAIS OU SINTOMAS APRESENTOU

Se apresenta alguma(s) das doenças abaixo:

Asma, sangramentos, pólipos nasais, rinite, doença renal, doença do fígado ou úlcera estomacal

- Informe se já fazia uso de algum desses medicamentos
- Se for gestante ou planeja engravidar, converse com seu médico

## Qual a melhor forma de tomar esses medicamentos?

- Dê preferência a sempre tomar com água, aproximadamente 200 mililitros (ou um copo cheio)
- Se possível, tomar o medicamento sem partir, esmagar ou mastigá-lo

AAS/ASPIRINA:

Administrar preferencialmente com alimento

## O que fazer se esquecer de tomar?

- Tome o medicamento assim que lembrar, mas se estiver perto da próxima dose, pule a dose e volte ao horário normal
- Não tome 2 doses ao mesmo tempo ou doses extras

## Para quais SINAIS e SINTOMAS preciso estar atento e informar ao médico imediatamente?

